



Tâche professionnelle	Comprendre les caractéristiques de médicaments pour les prescrire à un(e) patient(e)
Durée de la séance	1h30
Savoir-faire langagier(s)	Comprendre la partie "Observations" d'un dossier patient Comprendre et interpréter les caractéristiques d'un médicament (identification, indications thérapeutiques, posologie, contre-indications)
Outils langagiers	Les symptômes Les indications et les formes thérapeutiques Les expressions du conseil, de l'interdiction

Activité 1 : Identifier une prescription

Lisez l'ordonnance. Entourez l'image qui correspond à la prescription.

Dr BENTAMI Houria 26 rue Notre Dame 31400 Toulouse 05.78.45.23.12	Médecine Générale RPPS : 10100345891 Le 03/04/XX
---	--

PIVALONE 1% susp nas pulv
1 pulvérisation par voie nasale le matin et le soir, pendant 5 jours

1

Activité 2 : Repérer les rubriques d'une fiche médicament

Lisez la fiche du médicament prescrit et complétez.

posologie – contre-indications – principe(s) actif(s) – classe thérapeutique – indications thérapeutiques

PIVALONE SUSP NAS PULV 10ml		
Identification :	 : Tixocortol pivalate	 : Corticoïde (R)
..... :	Utilisé dans le traitement des manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, saisonnières, congestives aiguës et chroniques, vaso-motrices.	
..... et	1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.	
..... :	Contre-indiqué chez les enfants de moins de 3 ans	
	<u>Ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :</u>	
	Infection virale ou fongique locale	
	Saignement du nez	
	Chirurgie ou traumatisme du nez récents	

Activité 3 : Comprendre les notes d'observation dans un dossier patient

a) Lisez les dossiers patients suivants.

DOSSIER PATIENT-E	
Nom, Prénom : Santos, Mariles	Âge : 22 ans
Date : 03/04/XX	OBSERVATIONS
Congestion, écoulements nasaux épais et purulents Nez douloureux (choc au rugby), inflammation légère, pas de déviation	

DOSSIER PATIENT-E	
Nom, Prénom : Gardet, Loïc	Âge : 38 ans
Date : 03/04/XX	OBSERVATIONS
Éternuements et irritation importante des yeux au contact de chats Ne supporte pas les antihistaminiques	

À qui est destinée l'ordonnance (activité 1) ?

Quels éléments des notes d'observations vous ont permis de l'identifier ?

.....

Activité 4 : Reconnaître les symptômes d'un(e) patient(e)

a) Notez les symptômes des patient(e)s Mariles et Loïc (activité 3).



1.

Écoulements nasaux



2.



3.



4.



5.

.....

b) Identifiez ces autres symptômes à l'aide des étiquettes.

2

douleurs musculaires

maux de ventre

inflammation

difficultés respiratoires

fièvre

toux

vomissements

humeur dépressive

jambe gonflée

(sensation de) brûlure



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.

Activité 5 : Identifier les symptômes associés aux indications thérapeutiques d'une fiche médicament

Complétez les notices des médicaments suivants.

des troubles - des douleurs – des infections - d'affection - des traumatismes – de l'insuffisance

CAPTOPRIL 25mg Gél	
Indications thérapeutiques	Traitement de l'hypertension artérielle et cardiaque.

VOLTARENE EMULGEL GEL 1%	
Indications thérapeutiques	Utilisé dans le traitement local de courte durée bénins, des douleurs musculaires.

SPASFON CPR 30FON CPR 30	
Indications thérapeutiques	Médicament qui soulage spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CIPROFLAXINE CPR 500mg	
Indications thérapeutiques	Utilisé pour traiter bactériennes des voies respiratoires, de l'oreille ou des sinus.


MUCOMYST 200MG PDR SOL BUV 18	
Indications thérapeutiques	Ce médicament est indiqué en cas respiratoire récente avec difficulté d'expectoration.

FLUOXÉTINE 20MG Gél	
Indications thérapeutiques	Traitement des états dépressifs, obsessionnels compulsifs, de la boulimie.

Activité 6 : Identifier les différentes formes thérapeutiques

Classez les formes thérapeutiques suivantes.

*un sirop – un comprimé – un suppositoire – des gouttes pour les yeux – une suspension nasale
une gélule - une crème – un ovule – une solution buvable – une injection
une pommade – un gel ophtalmique*



Activité 7 : Identifier la posologie et les contre-indications d'une fiche médicament

Complétez les notices des médicaments avec les expressions suivantes.

ne jamais utiliser, déconseillé, recommandé, ne pas dépasser, réservé

- a) Ce médicament est en cas de grossesse (sauf si nécessaire et sous surveillance).
- b) AMOXICILLINE EG 1 en cas d'allergie à un antibiotique
- c) Dans tous les cas 3 comprimés à 400 mg par jour (soit 1200 mg/jour).
- d) à l'adulte.
- e) chez les enfants de moins de 6 ans.

Activité 8 : Déterminer l'indication thérapeutique correspondant aux symptômes

Associez les symptômes aux indications thérapeutiques.

OBSERVATIONS		Indications thérapeutiques
1. Maux de ventre pendant les menstruations.	•	• A. Traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.
2. Toux grasse avec sécrétion.	•	• B. Médicament qui soulage les douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.
3. Consommation excessive de nourriture, vomissements forcés.	•	• C. Utilisé pour traiter des infections bactériennes des voies respiratoires, de l'oreille ou des sinus.
4. Tension élevée, palpitations.	•	• D. Utilisé dans le traitement local de courte durée des traumatismes bénins, des douleurs musculaires.
5. Fièvre, douleurs aiguës dans l'oreille droite, tympan purulent.	•	• E. Ce médicament est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration.
6. Douleur à la main droite, difficulté à serrer la main.	•	• F. Traitement des états dépressifs, des troubles obsessionnels compulsifs, de la boulimie.

Activité 9 : Décider de l'indication d'un médicament à un profil de patient

Qui peut prendre ce médicament ? Entourez les profils qui correspondent.

IBUPROFENE 400mg	
Posologie et contre-indications :	Réservé à l'adulte et l'enfant à partir de 30kg. La posologie usuelle est de 1 comprimé (400 mg) par prise, à renouveler si besoin au bout de 6 heures. Dans tous les cas, ne pas dépasser 3 comprimés par jour (soit 1200 mg par jour). Le sujet âgé présentant un risque accru d'effets indésirables, utilisez la dose la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes. <u>Grossesse</u> : ne prendre EN AUCUN CAS à partir du 6^{ème} mois. Contre-indiqué au cours des 5 premiers mois de grossesse (sauf en cas d'absolue nécessité qui est déterminée par votre médecin)

Luca, 3 mois, 6kg

Raïma, 15 ans, 45 kg

Benjamin 4 ans, 20kg

Gabriel, 37 ans

Sarah, enceinte de 3 mois

Activité 10 : Prescrire un traitement à un(e) patient(e)

Vous exercez en tant que médecin généraliste.

Vous prescrivez un médicament à votre patiente.

Rédigez votre ordonnance en vous appuyant sur

-la partie « Observations du dossier médical de votre patiente » (document 1)

-les fiches médicaments que vous avez consultées (document 2)

DOCUMENT 1

DOSSIER PATIENT·E	
Nom, Prénom : Dussa, Charlie	Âge : 4 ans
Date : 11/04/XX	OBSERVATIONS
	Température de 38,5°C, mal de tête, fatigue et perte d'appétit.

5

DOCUMENT 2

PARACÉTAMOL 1G CPR		
Identification :	Principe(s) actif(s) : Paracétamol	Classe thérapeutique : Antalgique/ Antipyrétique
Indications thérapeutiques	Utilisé pour faire baisser la fièvre et soulager les douleurs légères à modérées chez l'adulte et l'enfant à partir de 50kg.	
Posologie et contre-indications :	Dose quotidienne à répartir en plusieurs prises. 1000mg (1 comprimé) maximum par prise. Espacer les prises d'au moins 4h et ne pas dépasser 3000mg par jour (3 comprimés). Ne jamais utiliser en cas de : allergie au paracétamol ; maladie grave du foie	

DOLIPRANE 2,4% SUSP BUV		
Identification :	Principe(s) actif(s) : Paracétamol	Classe thérapeutique : Antalgique/ Antipyrétique
Indications thérapeutiques	Utilisé pour traiter la douleur et/ou la fièvre, les états grippaux.	
Posologie et contre-indications :	Cette présentation est réservée à l'enfant de 3 à 26 kg (soit environ de la naissance à 9 ans). Administration en 4 prises maximales, soit environ 15 mg/kg toutes les 6 heures ou 10 mg/kg toutes les 4 heures. Ne jamais utiliser en cas de : allergie au paracétamol ; maladie grave du foie	

OXOMEMAZINE 0,33mg/ml Sirop		
Identification :	Principe(s) actif(s) : Oxomémazine	Classe thérapeutique : Antihistaminique
Indications thérapeutiques	Préconisé pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et l'enfant de plus de 2 ans.	
Posologie et contre-indications :	Chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg : 10 ml par prise, 4 fois par jour. Enfants : -2 à 6 ans = 5 ml par prise, 2 à 3 fois par jour. -6 à 10 ans = 10 ml par prise, 2 à 3 fois par jour. -10 à 12 ans 10 ml par prise, 3 à 4 fois par jour. Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin, pendant le premier trimestre de la grossesse.	

Sélectionnez le médicament à prescrire à votre patient.

Dr FADIER Pascal
3 Avenue du Président Wilson
24000 Périgueux
05.34.90.68.01

Médecine Générale
RPPS : 12459067182

Le 11/04/XX

- ☐ OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33mg/ml - 5ml 3 fois par jour (matin, midi et soir)
- ☐ DOLIPRANE 2,4% SUSP BUV – 270mg 2 fois par jour, renouveler si besoin
- ☐ PARACÉTAMOL 1G CPR – 1 comprimé, 2 fois par jour

Dr FADIER Pascal
Médecine générale
RPPS : 12459067182

CORRIGÉ

Activité 1 : B

Activité 2 :

Identification :	Principe(s) actif(s) : Tixocortol pivalate	Classe thérapeutique : Corticoïde (R)
indications thérapeutiques :	Utilisé dans le traitement des manifestations inflammatoires et allergiques du rhino-pharynx : rhinites allergiques, saisonnières, congestives aiguës et chroniques, vaso-motrices.	
posologie et contre-indications :	1 à 2 pulvérisations dans chaque narine 2 à 4 fois par jour. <u>Contre-indiqué chez les enfants de moins de 3 ans</u> <u>Ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :</u> Infection virale ou fongique locale Saignement du nez Chirurgie ou traumatisme du nez récents	

Activité 3 :

- a) Loïc Gardet
b) Observations et contre-indications : Mariles a eu un choc, elle ne peut pas prendre ce médicaments

Activité 4

- a) 1=écoulements nasaux 2=éternuements 3=inflammation, nez douloureux
 4=congestion 5= irritation des yeux
- b) 6=sensation de brûlure 7=fièvre 8=maux de ventre 9=vomissements
 10=toux 11=inflammation 12=douleurs musculaires 13=difficultés respiratoires
 14=humeur dépressive 15=jambe gonflée

Activité 5

	CAPTOPRIL 25mg Gél
Indications thérapeutiques	Traitement de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.

	VOLTARENE EMULGEL GEL 1%
Indications thérapeutiques	Utilisé dans le traitement local de courte durée des traumatismes bénins, des douleurs musculaires.

	SPASFON CPR 30FON CPR 30
Indications thérapeutiques	Médicament qui soulage des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

	CIPROFLAXINE CPR 500mg
Indications thérapeutiques	Utilisé pour traiter des infections bactériennes des voies respiratoires, de l'oreille ou des sinus.

	MUCOMYST 200MG PDR SOL BUV 18
Indications thérapeutiques	Ce médicament est indiqué en cas d'affection respiratoire récente avec difficulté d'expectoration.

	FLUOXÉTINE 20MG Gél
Indications thérapeutiques	Traitement des états dépressifs, des troubles obsessionnels compulsifs, de la boulimie.

Activité 6

Voie orale = *un sirop – un comprimé - une solution buvable - une gélule*

Voie cutanée = *une crème – une pommade*

Voie oculaire = *des gouttes pour les yeux - un gel ophtalmique*

Voie injectable = *une injection*

Voie nasale = *une suspension nasale*

Voie rectale/vaginale = *un suppositoire - un ovule*

Activité 7

a) déconseillé b) ne jamais utiliser c) ne pas dépasser d) réservé e) recommandé

Activité 8

1=B 2=E 3=F 4=A 5=C 6=D

Activité 9

Raïma, 15 ans, 45 kg

Gabriel 37 ans

Sarah enceinte de 3 mois

Activité 10

☐ OXOMEMAZINE SANDOZ 0,33mg/ml - 5ml 3 fois par jour (matin, midi et soir)

☒ DOLIPRANE 2,4% SUSP BUV – 270mg 2 fois par jour, renouveler si besoin

☐ PARACÉTAMOL 1G CPR – 1 comprimé, 2 fois par jour